

## Analízis III. 8. heti feladatok 2017. november 10.

### Variációszámítás 1. rész.

1. (Átvezető feladat, felszínszámítás) Adott az  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^+$  függvény, és ennek gráfját forgassuk meg az  $x$  tengely körül. Igazoljuk, hogy az így kapott forgástest felszínének mértéke:

$$2\pi \cdot \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'^2(x)} \, dx.$$

2. Adott a síkon két pont  $A(a, \alpha)$  és  $B(b, \beta)$ , ahol  $a < b$ . Határozzuk meg a pontokat összekötő görbék közül azt, amelynek ívhossza minimális. Igazoljuk, hogy ez egyenes szakasz.  
(Az alapfeladat és a stacionáris megoldásra vonatkozó Euler-egyenlet átismétlése a cél.)

3. Határozzuk meg az alábbi integrálhoz tartozó stacionárius függvényt:

$$(a) \quad I(u) = \int_0^1 (2u + (u')^2) \, dx, \quad u(0) = 0, \quad u(1) = 1$$

$$[\text{HF}] (b) \quad I(u) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} ((u')^2 - u^2) \, dx, \quad u(-\pi/2) = u(\pi/2) = 0$$

4. Írjuk fel a megfelelő Euler-egyenletet az alábbi funkcionálok esetén és számoljuk ki annak összes megoldását:

$$(a) \quad I(u) = \int_0^1 (x + u + 3u') \, dx \qquad (b) \quad I(u) = \int_0^2 (u + xu') \, dx$$

5. Írjuk fel a megfelelő Euler-egyenletet és számoljuk ki annak összes megoldását az alábbi alapfüggvények esetén:

$$(a) \quad F(x, u, u') = u^2 + 2(u')^2 - 2u \sin x \qquad [\text{HF}] (b) \quad F(x, u, u') = (u')^2 + 2uu' - 16u^2$$

**Állítás.** Az alkalmazásokban leggyakoribb esetében, az alapfüggvény  $F(x, u, u')$  nem függ közvetlenül  $x$ -től, azaz  $F = F(u, u')$  alakú. Ekkor definiáljuk a következő energiafüggvényt:

$$E(x) = F(u(x), u'(x)) - u'(x)F'_{u'}(u(x), u'(x)), \quad \text{avagy rövidebben: } E = F - u'F'_{u'} \quad (1)$$

Ekkor a stacionárius megoldások meghatározása végett elégséges megoldani az Euler-egyenlettel ekvivalens  $E = F - u'F'_{u'} = C_1$  differenciálegyenletet, ahol  $C_1 \in \mathbb{R}$  konstans.

6. (Minimalis felszínű forgástest) Keressük az  $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$  kétszer folytonosan differenciálható,

$$f(0) = f(2) = \frac{e^2 + 1}{2e} \quad (2)$$

feltételeket kielégítő függvények közül azt, melyre a görbe által meghatározott forgástest felszíne minimális.

7. Határozzuk meg a Bernoulli feladat megoldását:  $T = \frac{1}{\sqrt{2g}} \int_a^b \sqrt{\frac{1 + y'(x)^2}{\frac{E_0}{mg} - y(x)}} \, dx.$

8. (Elgondolkodtató) Adjuk meg azt az  $u : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  függvényt, melyre  $u(a) = u(b) = u_0$  és az  $u(x)$  függvény alatti **előjeles** terület minimális, vagyis  $\int_a^b u(x) \, dx$  minimális. Adjuk meg a megfelelő Euler-egyenletet. Ha az energiafüggvényt alkalmazzuk látszólag ellentmondásba ütközünk, miért? Miért nincs ellentmondás?

- D6\* Határozzuk meg az alábbi integrálhoz tartozó stacionárius  $u : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $u(0) = 0$ ,  $u(1) = 1$  függvényt:

$$I(u) = \int_0^1 (u')^2 f(x) \, dx, \quad f(x) = \begin{cases} -1 & 0 \leq x < \frac{1}{4} \\ 1 & \frac{1}{4} \leq x \leq 1 \end{cases}.$$